




Series : ZYWX1

SET ~ 3



रोल नं.  
Roll No.



प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code **56/1/3**

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

नोट / NOTE



- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।  
Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- (II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।  
Please check that this question paper contains 33 questions.
- (III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।  
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।  
Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।  
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



रसायन विज्ञान (सैद्धांतिक)  
CHEMISTRY (Theory)



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

56/1/3

730-3

1

P.T.O.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ तथा ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 प्रकरण आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

जहाँ आवश्यक हो, आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानों का उपयोग कर सकते हैं :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या} = 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल}$$

$$\text{बोल्ट्ज़मान नियतांक} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$





**General Instructions :**

**Read the following instructions carefully and follow them :**

- (i) *This question paper contains 33 questions. All questions are compulsory.*
- (ii) *This question paper is divided into five sections – Section A, B, C, D and E.*
- (iii) *Section A – questions number 1 to 16 are multiple choice type questions. Each question carries 1 mark.*
- (iv) *Section B – questions number 17 to 21 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.*
- (v) *Section C – questions number 22 to 28 are short answer type questions. Each question carries 3 marks.*
- (vi) *Section D – questions number 29 and 30 are case-based questions. Each question carries 4 marks.*
- (vii) *Section E – questions number 31 to 33 are long answer type questions. Each question carries 5 marks.*
- (viii) *There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section –A.*
- (ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*
- (x) *Use of calculator is NOT allowed.*

*You may use the following values of physical constants wherever necessary :*

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (} m_e \text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann's constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$






खण्ड – क

(16 × 1 = 16)

प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

1.  $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$  युग्म के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.15 V और  $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}$  युग्म के लिए यह -0.74 V है। दो युग्म अपनी मानक अवस्थाओं में संयोजित होकर एक सेल का निर्माण करते हैं। सेल विभव होगा  
 (A) +1.19 V (B) +0.89 V  
 (C) +0.18 V (D) +1.83 V
2. चुंबकीय आघूर्ण इसके प्रचक्रणी कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग से जुड़ा होता है।  $\text{Cr}^{3+}$  आयन (परमाणु क्रमांक : Cr = 24) का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण मान \_\_\_\_\_ है।  
 (A) 2.87 B.M. (B) 3.87 B.M.  
 (C) 3.47 B.M. (D) 3.57 B.M.
3. संगुणन में विलेय का अपसामान्य मोलर द्रव्यमान  
 (A) बढ़ेगा (B) घटेगा  
 (C) अपरिवर्तित रहेगा (D) पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा
4. नाभिकरागी द्विआणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से गुजरने वाले ऐल्किल हैलाइड में सम्मिलित है  
 (A) विन्यास का धारण (B) रेसिमिक मिश्रण का बनना  
 (C) विन्यास का प्रतिलोमन (D) कार्बोधनायन का निर्माण
5. निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें :



सही क्रम है


- (A) (ii) < (i) < (iii) (B) (i) < (ii) < (iii)  
 (C) (iii) < (i) < (ii) (D) (iii) < (ii) < (i)



**SECTION – A****(16 × 1 = 16)**

Questions No. 1 to 16 are Multiple Choice type questions carrying 1 mark each.

- Standard electrode potential for  $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$  couple is +0.15 V and that for the  $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}$  couple is –0.74 V. The two couples in their standard states are connected to make a cell. The cell potential will be  
(A) +1.19 V (B) +0.89 V  
(C) +0.18 V (D) +1.83 V
- The magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. Spin only magnetic moment value of  $\text{Cr}^{3+}$  ion (Atomic no. : Cr = 24) is \_\_\_\_\_.  
(A) 2.87 B.M. (B) 3.87 B.M.  
(C) 3.47 B.M. (D) 3.57 B.M.
- In case of association, abnormal molar mass of solute will  
(A) increase (B) decrease  
(C) remain same (D) first increase and then decrease
- Alkyl halides undergoing nucleophilic bimolecular substitution reaction involve  
(A) retention of configuration (B) formation of racemic mixture  
(C) inversion of configuration (D) formation of carbocation
- Arrange the following compounds in increasing order of their boiling points :



The correct order is

- (A) (ii) < (i) < (iii) (B) (i) < (ii) < (iii)  
(C) (iii) < (i) < (ii) (D) (iii) < (ii) < (i)



6.  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^{2+}$  का सही IUPAC नाम है
- (A) डाइऐम्मीनडाइक्लोरिडोप्लैटिनम (II)  
(B) डाइऐम्मीनडाइक्लोरिडोप्लैटिनम (IV)  
(C) डाइऐम्मीनडाइक्लोरिडोप्लैटिनम (O)  
(D) डाइऐम्मीनडाइक्लोरिडोप्लैटिनेट (IV)
7. प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को  $\text{CO}_2$  के साथ अभिक्रियित करने के पश्चात् अम्ल जलअपघटन करने पर बनने वाला अम्ल है
- (A)  $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$  (B)  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$   
(C)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (D)  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$
8. अम्लीय  $\text{KMnO}_4$  सल्फाइट को ऑक्सीकृत कर देता है
- (A)  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  में (B)  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$  में  
(C)  $\text{SO}_2(\text{g})$  में (D)  $\text{SO}_4^{2-}$  में
9. निम्नलिखित में अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा है ?
- (A)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{H}_2\text{O} > \text{ROH}$  (B)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{ROH} > \text{H}_2\text{O}$   
(C)  $\text{ROH} > \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{H}_2\text{O}$  (D)  $\text{H}_2\text{O} > \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{ROH}$
10. अचार बनाने के लिए नमक के सांद्र विलयन में रखा गया कच्चा आम सिकुड़ जाता है, क्योंकि \_\_\_\_\_
- (A) यह परासरण के कारण जल प्राप्त करता है ।  
(B) यह उत्क्रम परासरण के कारण जल खो देता है ।  
(C) यह उत्क्रम परासरण के कारण जल प्राप्त करता है ।  
(D) यह परासरण के कारण जल खो देता है ।





- 
6. The correct IUPAC name of  $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]^{2+}$  is
- (A) Diamminedichloridoplatinum (II)  
(B) Diamminedichloridoplatinum (IV)  
(C) Diamminedichloridoplatinum (O)  
(D) Diamminedichloridoplatinate (IV)
7. The acid formed when propyl magnesium bromide is treated with  $\text{CO}_2$  followed by acid hydrolysis is :
- (A)  $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$  (B)  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$   
(C)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (D)  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$
8. Acidified  $\text{KMnO}_4$  oxidises sulphite to
- (A)  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  (B)  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$   
(C)  $\text{SO}_2(\text{g})$  (D)  $\text{SO}_4^{2-}$
9. Which is the correct order of acid strength from the following ?
- (A)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{H}_2\text{O} > \text{ROH}$  (B)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{ROH} > \text{H}_2\text{O}$   
(C)  $\text{ROH} > \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{H}_2\text{O}$  (D)  $\text{H}_2\text{O} > \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{ROH}$
10. An unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle, shrivels because \_\_\_\_\_.
- (A) it gains water due to osmosis  
(B) it loses water due to reverse osmosis  
(C) it gains water due to reverse osmosis  
(D) it loses water due to osmosis



11. प्रोपेनेमाइड को प्रोपेनेमीन में परिवर्तित करने के लिए सबसे उत्तम अभिकर्मक \_\_\_\_\_ है ।

- (A)  $H_2$  का आधिक्य
- (B) जलीय NaOH में  $Br_2$
- (C) लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन
- (D) ईथर में  $LiAlH_4$

12. निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लूकोज के विषय में सत्य नहीं है ?

- (A) यह एक एल्डोहेक्सोस है ।
- (B) HI के साथ गर्म करने पर यह n-हेक्सेन बनाता है ।
- (C) यह फ्यूरेनोस रूप में उपस्थित होता है ।
- (D) यह शिफ-परीक्षण नहीं देता है ।

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है । इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है ।
- (B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है ।
- (C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है ।
- (D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है ।

13. **अभिकथन (A)** : ग्लाइसीन के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले  $\alpha$ -ऐमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं ।

**कारण (R)** : अधिकांश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐमीनो अम्लों में L-विन्यास होता है ।

14. **अभिकथन (A)** : एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से अधिक होता है ।

**कारण (R)** : एथेनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है ।





- 
11. The best reagent for converting propanamide into propanamine is \_\_\_\_\_.
- (A) excess  $H_2$   
(B)  $Br_2$  in aqueous NaOH  
(C) iodine in the presence of red phosphorus  
(D)  $LiAlH_4$  in ether
12. Which of the following statements is not true about glucose ?
- (A) It is an aldohexose.  
(B) On heating with HI it forms n-hexane.  
(C) It exists in furanose form.  
(D) It does not give Schiff's test.

For questions number **13** to **16**, two statements are given – one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).  
(C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.  
(D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
13. **Assertion (A)** : All naturally occurring  $\alpha$ -amino acids except glycine are optically active.  
**Reason (R)** : Most naturally occurring amino acids have L-configuration.
14. **Assertion (A)** : The boiling point of ethanol is higher than that of methoxymethane.  
**Reason (R)** : There is intramolecular hydrogen bonding in ethanol.



15. **अभिकथन (A)** : ऐल्किल हैलाइडों के क्वथनांक निम्न क्रम में घटते हैं :  $RI > RBr > RCl > RF$  ।  
**कारण (R)** : ऐल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के क्वथनांक तुलनीय आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में काफी अधिक होते हैं ।
16. **अभिकथन (A)** :  $[Cr(H_2O)_6]Cl_2$  तथा  $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$  होमोलेप्टिक संकुल के उदाहरण हैं ।  
**कारण (R)** : धातु के साथ जुड़े सभी लिगेण्ड एक प्रकार के हैं ।

### खण्ड – ख

17. क्या आप अपेक्षा करते हैं कि प्रोपेनल की तुलना में बेंजैल्डिहाइड नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील या कम अभिक्रियाशील होगा ? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए । 2
18. निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए : 2
- (a)  $8MnO_4^- + 3S_2O_3^{2-} + H_2O \longrightarrow$
- (b)  $Cr_2O_7^{2-} + 3Sn^{2+} + 14H^+ \longrightarrow$
19. (A) कारण बताइए : (1 + 1 = 2)
- (a) प्रेशर-कूकर में खाना पकाना, खुले बर्तन (कड़ाही) की तुलना में तेज होता है ।
- (b) द्रव X और द्रव Y को मिलाने पर, परिणामी विलयन का आयतन कम हो जाता है । परिणामी विलयन राउल्ट के नियम से किस प्रकार का विचलन दर्शाता है ? द्रव X और Y को मिलाने के बाद आप ताप में क्या परिवर्तन प्रेक्षित करेंगे ?

### अथवा

- (B) स्थिरक्वाथी को परिभाषित करें । राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन से किस प्रकार का स्थिरक्वाथी बनता है ? एक उदाहरण दीजिए । 2





15. **Assertion (A)** : The boiling points of alkyl halides decrease in the order :  
 $RI > RBr > RCl > RF$ .

**Reason (R)** : The boiling points of alkyl chlorides, bromides and iodides are considerably higher than that of the hydrocarbon of comparable molecular mass.


16. **Assertion (A)** :  $[Cr(H_2O)_6]Cl_2$  and  $[Fe(H_2O)_6]Cl_2$  are examples of homoleptic complexes.

**Reason (R)** : All the ligands attached to the metal are the same.

### SECTION – B

17. Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reactions than propanal ? Justify your answer. 2

18. Complete and balance the following chemical equations : 2



19. (A) Give reasons : (1 + 1 = 2)

(a) Cooking is faster in pressure cooker than in an open pan.



(b) On mixing liquid X and liquid Y, volume of the resulting solution decreases. What type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution ? What change in temperature would you observe after mixing liquids X and Y ?

**OR**

(B) Define Azeotrope. What type of Azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law ? Give an example. 2



20. निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम अभिक्रिया में A और B की पहचान कीजिए : (1 + 1 = 2)



21. इनके जल-अपघटन उत्पाद क्या हैं ? 2


(a) सूक्रोज

(b) लैक्टोज

### खण्ड - ग

22. 298 K पर जल में  $\text{CO}_2$  गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान  $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$  है। समान ताप पर 500 ml सोडा जल  $2.53 \times 10^5 \text{ Pa}$  दाब पर बंद किया गया। सोडा जल में घुली हुई  $\text{CO}_2$  के मोलों की गणना कीजिए। 3

23. अभिक्रिया के  $\Delta_r G^\circ$  और  $\log K_C$  की गणना कीजिए। 3



दिया गया है :  $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0.74 \text{ V}$

$$E^\circ_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0.40 \text{ V}$$

[ $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ,  $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$ ]



24. जब ताप 293 K से 313 K तक बदलता है तो अभिक्रिया की दर चौगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए यह मानते हुए कि यह ताप के साथ नहीं बदलती है। 3

[दिया है :  $\log 4 = 0.602$ ,  $\log 2 = 0.301$ ,  $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ ]





20. Identify A and B in each of the following reaction sequence : (1 + 1 = 2)



21. What are the hydrolysis products of : 2

(a) Sucrose

(b) Lactose

### SECTION - C

22. Henry's law constant for  $\text{CO}_2$  in water is  $1.67 \times 10^8$  Pa at 298 K. Calculate the number of moles of  $\text{CO}_2$  in 500 ml of soda water when packed under  $2.53 \times 10^5$  Pa at the same temperature. 3

23. Calculate  $\Delta_r G^\circ$  and  $\log K_C$  of the reaction. 3



Given  $E^\circ_{\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}} = -0.74$  V

$$E^\circ_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0.40$$
 V




[ $R = 8.314$  J  $\text{K}^{-1}$   $\text{mol}^{-1}$ ,  $F = 96500$  C  $\text{mol}^{-1}$ ]

24. The rate of a reaction quadruples when the temperature changes from 293 K to 313 K. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. 3

[Given :  $\log 4 = 0.602$ ,  $\log 2 = 0.301$ ,  $R = 8.314$  J  $\text{K}^{-1}$   $\text{mol}^{-1}$ ]



25. (A) निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के लिए प्रमुख मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइये : (1 + 1 + 1 = 3)



अथवा

(B) आप कैसे रूपांतरित करेंगे ? (3 × 1 = 3)

- (a) क्लोरोबेन्ज़ीन को बाईफेनिल में  
(b) प्रोपीन को 1-आयडोप्रोपेन में  
(c) 2-ब्रोमोब्यूटेन को ब्यूट-2-ईन में

26. 3d संक्रमण श्रेणी के तत्व इस प्रकार दिए गए हैं : (1 + 1 + 1 = 3)

Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn

निम्नलिखित का उत्तर दीजिए :

- (a) कॉपर का  $E_{M^{2+}/M}^\circ$  मान असाधारण रूप से धनात्मक है, क्यों ?  
(b) कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था में एक प्रबल अपचायक है और क्यों ?  
(c)  $Zn^{2+}$  लवण रंगहीन होते हैं, क्यों ?

27. (a) निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें : (1 + 2 = 3)

$(CH_3)_2NH$ ,  $CH_3CH_2NH_2$ ,  $CH_3CH_2OH$




(b) निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए संभावित स्पष्टीकरण दीजिए :

- (i) ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीनों को गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण से नहीं बनाया जा सकता ।  
(ii) एमाइड, ऐमीनों की तुलना में कम क्षारकीय होते हैं ।





25. (A) Draw the structure of the major monohalo product for each of the following reaction : (1 + 1 + 1 = 3)



**OR**

- (B) How do you convert : (3 × 1 = 3)
- Chlorobenzene to biphenyl
  - Propene to 1-Iodopropane
  - 2-bromobutane to but-2-ene.
26. The elements of 3d transition series are given as : (1 + 1 + 1 = 3)

Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn

Answer the following :

- Copper has exceptionally positive  $E_{M^{2+}/M}^\circ$  value, why ?
  - Which element is a strong reducing agent in +2 oxidation state and why ?
  - $Zn^{2+}$  salts are colourless. Why ?
27. (a) Arrange the following compounds in increasing order of their boiling point : (1 + 2 = 3)  
 $(CH_3)_2NH$ ,  $CH_3CH_2NH_2$ ,  $CH_3CH_2OH$ .
- (b) Give plausible explanation for each of the following :
- Aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel Phthalimide synthesis.
  - Amides are less basic than amines.



28. निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें :

3

- (a) प्राकृत प्रोटीन
- (b) न्यूक्लियोटाइड
- (c) आवश्यक ऐमीनो अम्ल

### खण्ड – घ

निम्नलिखित प्रश्न प्रकरण आधारित प्रश्न है। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

29. रासायनिक अभिक्रिया का वेग या तो प्रति इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता से सीधे संबंधित होता है। वेग नियम बताता है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता पदों पर निर्भर करता है जिस पर अभिक्रिया का वेग वास्तव में निर्भर करता है, जैसा कि प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है। वेग नियम अभिव्यक्ति में अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है जबकि एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज की संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया सम्पन्न करने के लिए एक साथ संघट्ट करती है, अभिक्रिया की आण्विकता कहलाती है।

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) (i) वेग निर्धारक पद क्या है ? (1 + 1 = 2)
- (ii) जटिल अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए।
- (b) वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ? 1

### अथवा

- (b) आण्विकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही क्यों लागू होती है जबकि कोटि प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया दोनों के लिए लागू होती हैं ? 1
- (c) अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बलगतिकी के अनुरूप होता है। यदि X की सांद्रता तीन गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 1





28. Define the following terms :

3

- (a) Native protein
- (b) Nucleotide
- (c) Essential amino acid

### SECTION – D

The following questions are case based questions. Read the passage carefully and answer the questions that follow.

29. The rate of a chemical reaction is expressed either in terms of decrease in the concentration of reactants or increase in the concentration of a product per unit time. Rate of the reaction depends upon the nature of reactants, concentration of reactants, temperature, presence of catalyst, surface area of the reactants and presence of light. Rate of reaction is directly related to the concentration of reactant. Rate law states that the rate of reaction depends upon the concentration terms on which the rate of reaction actually depends, as observed experimentally. The sum of powers of the concentration of the reactants in the Rate law expression is called order of reaction while the number of reacting species taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction.

Answer the following questions :

- (a) (i) What is a rate determining step ? (1 + 1 = 2)
- (ii) Define complex reaction.
- (b) What is the effect of temperature on the rate constant of a reaction ? 1

**OR**

- (b) Why is molecularity applicable only for elementary reactions whereas order is applicable for elementary as well as complex reactions ? 1
- (c) The conversion of molecule X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased 3 times, how will it affect the rate of formation of Y ? 1



30. बेन्जीन वलय से जुड़े OH समूह के प्रबल सक्रियण प्रभाव के कारण फ़ीनॉल आसानी से इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देते हैं। चूँकि OH समूह o- और p- स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को अधिक बढ़ाता है, इसलिए OH समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है। राइमर-टीमन इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में से एक है। जिसके द्वारा फ़ीनॉल की एरोमैटिक वलय में हाइड्रॉक्सिल समूह की ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड समूह प्रवेश कर जाता है। यह एक सामान्य विधि है जो फ़ीनॉलों के ऑर्थो फार्मिलन के लिए प्रयुक्त की जाती है।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (a) क्या होता है जब फ़ीनॉल निम्न से अभिक्रिया करता है ? 2
- (i)  $\text{Br}_2/\text{CS}_2$
- (ii) सांद्र  $\text{HNO}_3$
- (b) फ़ीनॉल का प्रोटॉनन आसानी से क्यों नहीं होता है ? 1
- (c) कौन सा एक प्रबल अम्ल है : फ़ीनॉल अथवा क्रीसॉल ? कारण दीजिए। 1

**अथवा**

- (c) राइमर-टीमन अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का IUPAC नाम लिखें। 1

**खण्ड - ड**

31. (A) (a) निम्नलिखित रूपांतरण करें : (2 + 3 = 5)
- (i) एथेनेल से ब्यूट-2-ईनैल
- (ii) प्रोपेनोइक अम्ल से एथेन
- (b) आण्विक सूत्र  $\text{C}_5\text{H}_{10}$  वाला एक एल्कीन A ओजोनी अपघटन पर दो यौगिकों B और C का मिश्रण देता है। यौगिक B धनात्मक फेलिंग परीक्षण देता है और आयोडीन और NaOH विलयन के साथ भी अभिक्रिया करता है। यौगिक C फेलिंग परीक्षण नहीं देता है लेकिन आयोडोफार्म बनाता है। यौगिक A, B और C की पहचान कीजिए।

**अथवा**





30. Phenols undergo electrophilic substitution reactions readily due to the strong activating effect of OH group attached to the benzene ring. Since, the OH group increases the electron density more to o- and p- positions therefore OH group is ortho, para-directing. Reimer-Tiemann reaction is one of the examples of aldehyde group being introduced on the aromatic ring of phenol, ortho to the hydroxyl group. This is a general method used for the ortho-formylation of phenols.

Answer the following questions :

- (a) What happens when phenol reacts with 2
- (i)  $\text{Br}_2/\text{CS}_2$
- (ii) Conc.  $\text{HNO}_3$
- (b) Why phenol does not undergo protonation readily ? 1
- (c) Which is a stronger acid – phenol or cresol ? Give reason. 1

**OR**

- (c) Write the IUPAC name of the product formed in the Reimer-Tiemann reaction. 1

**SECTION – E**

31. (A) (a) Carry out the following conversions : (2 + 3 = 5)
- (i) Ethanal to But-2-enal
- (ii) Propanoic acid to ethane
- (b) An alkene A with molecular formula  $\text{C}_5\text{H}_{10}$  on ozonolysis gives a mixture of two compounds B and C. Compound B gives positive Fehling test and also reacts with iodine and NaOH solution. Compound C does not give Fehling solution test but forms iodoform. Identify the compounds A, B and C.


**OR**



31. (B) एक कार्बनिक यौगिक (A) (आण्विक सूत्र  $C_8H_{16}O_2$ ) को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल (B) और एल्कोहॉल (C) प्राप्त हुआ। (C) का क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर (B) बनता है। निर्जलीकरण पर (C) ब्यूट-1-ईन देता है। (A), (B) और (C) को पहचानिए तथा सम्मिलित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए।

5



32. (A) निम्नलिखित संकुल आयनों के लिए संकरण का प्रकार, आकार और चुंबकीय गुण की व्याख्या कीजिए : (2½ × 2 = 5)



(परमाणु संख्या : Fe = 26, Ni = 28)


अथवा

32. (B) (a) निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए : (3 + 2 = 5)



(b) स्पेक्ट्रोसायनिक श्रेणी क्या है ? प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड में अंतर लिखिए।

33. (A) (a) निम्नलिखित के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए तथा 298 K पर सेल का e.m.f. परिकलित कीजिए : (3 + 2 = 5)




(दिया गया है :  $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = -0.14 V$ ,  $E^\circ_{H^+|H_2(g), Pt} = 0.00V$ )





31. (B) An organic compound (A) (molecular formula  $C_8H_{16}O_2$ ) was hydrolysed with dilute sulphuric acid to get a carboxylic acid (B) and an alcohol (C). Oxidation of (C) with chromic acid produced (B). (C) on dehydration gives But-1-ene. Identify (A), (B) and (C) and write chemical equations for the reactions involved. 5



32. (A) In the following complex ions, explain the type of hybridisation, shape and magnetic property : (2½ × 2 = 5)



(At. Nos. : Fe = 26, Ni = 28)


**OR**

32. (B) (a) Write IUPAC names of the following : (3 + 2 = 5)



(b) What is spectrochemical series ? Write the difference between a strong field ligand and a weak field ligand.

33. (A) (a) Write the cell reaction and calculate the e.m.f. of the following cell at 298 K : (3 + 2 = 5)



(Given :  $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = -0.14 V$ ,  $E^\circ_{H^+|H_2(g), Pt} = 0.00V$ )



(b) निम्नलिखित के कारण बताइए :


- (i)  $E^\circ$  मानों के आधार पर,  $O_2$  गैस एनोड पर मुक्त होनी चाहिए, लेकिन जलीय  $NaCl$  के विद्युत अपघटन में  $Cl_2$  गैस मुक्त होती है ।
- (ii) तनुकरण पर  $CH_3COOH$  की चालकता कम हो जाती है ।

अथवा

33. (B) (a) लेड स्टोरेज बैटरी के उपयोग के दौरान होने वाली एनोड और कैथोड अभिक्रियाएँ और समग्र सेल अभिक्रिया लिखें । (2 + 3 = 5)

(b)  $0.01 \text{ M } K_2Cr_2O_7(aq)$ ,  $0.01 \text{ M } Cr^{3+}(aq)$  और  $1.0 \times 10^{-4} \text{ M } H^+(aq)$  युक्त अर्ध सेल के लिए विभव की गणना करें ।

अर्ध-सेल अभिक्रिया है :



और मानक इलेक्ट्रोड विभव  $E^\circ = 1.33 \text{ V}$  दिया गया है ।

[दिया गया है :  $\log 10 = 1$ ]






- 
- (b) Account for the following ;
- (i) On the basis of  $E^\circ$  values,  $O_2$  gas should be liberated at anode but it is  $Cl_2$  gas which is liberated in the electrolysis of aqueous  $NaCl$ .
- (ii) Conductivity of  $CH_3COOH$  decreases on dilution.

**OR**

33. (B) (a) Write the anode and cathode reactions and the overall cell reaction occurring in a lead storage battery during its use. **(2 + 3 = 5)**
- (b) Calculate the potential for half-cell containing 0.01 M  $K_2Cr_2O_7(aq)$ , 0.01 M  $Cr^{3+}(aq)$  and  $1.0 \times 10^{-4}$  M  $H^+(aq)$ .

The half cell reaction is



and the standard electrode potential is given as  $E^\circ = 1.33$  V.

[Given :  $\log 10 = 1$ ]





**Marking Scheme**  
**Strictly Confidential**  
**(For Internal and Restricted use only)**  
**Senior School Certificate Examination, 2024-25**  
**SUBJECT NAME CHEMISTRY (Theory) -043**  
**(Q.P.CODE 56/1/3) MM: 70**

**General Instructions: -**

You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

**“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**

Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

The Marking scheme carries only suggested value points for the answers

These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

Evaluators will mark( ✓ ) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.

No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

A full scale of marks \_\_\_\_\_(example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-

- Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
- Giving more marks for an answer than assigned to it.
- Wrong totaling of marks awarded on an answer.
- Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
- Wrong question wise totaling on the title page.
- Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
- Wrong grand total.
- Marks in words and figures not tallying/not same.
- Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
- Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)

Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.


While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.




Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.




The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for Spot Evaluation**” before starting the actual evaluation.


Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

Q. No	Value points	Mark
<b>SECTION A</b>		
1	(B)	1
2	(B)	1
3	(A)	1
4	(C)	1
5	(C)	1
6	(B)	1
7	(A)	1
8	(D)	1
9	(A)	1
10	(D)	1
11	(D)	1
12	(C)	1
13	(B)	1
14	(C)	1
15	(B)	1
16	(A)	1
<b>SECTION B</b>		
17	Less reactive, The carbon atom of the carbonyl group of benzaldehyde is less electrophilic than carbon atom of the carbonyl group present in propanal./ The polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to resonance.	1 1
18	(a) $8\text{MnO}_4^- + 3\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 8\text{MnO}_2 + 6\text{SO}_4^{2-} + 2\text{OH}^-$ (b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{Sn}^{2+} + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{Sn}^{4+} + 7\text{H}_2\text{O}$	1 1
19	(A) (a) Due to high pressure inside the pressure cooker, higher is the boiling point and faster is the cooking. (b) Negative deviation Temperature increases.	1  $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
OR		
19	(B) Same composition in liquid and in vapour phase and boil at a constant temperature. Maximum Boiling Azeotrope 68% $\text{HNO}_3$ + 32% $\text{H}_2\text{O}$ (Or any other correct example) (Percentage can be ignored)	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
20	(a) A = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN}$ ; B = $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ (b) A = $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^-$ ;  <div style="text-align: center;">  <p>B =</p> </div>	$\frac{1}{2} \times 4$
21	a) Glucose + Fructose / Chemical equation b) Glucose + Galactose / Chemical equation	1 1
<b>SECTION C</b>		
22	$p_{\text{CO}_2} = K_H \chi_{\text{CO}_2}$ $K_H = 1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$ $p_{\text{CO}_2} = 2.53 \times 10^5 \text{ Pa}$	$\frac{1}{2}$

	$\chi_{\text{CO}_2} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{K_H}$ $= \frac{2.53 \times 10^5}{1.67 \times 10^8}$ $= 1.51 \times 10^{-3}$ $\chi_{\text{CO}_2} = \frac{n_{\text{CO}_2}}{n_{\text{H}_2\text{O}}}$ $n_{\text{H}_2\text{O}} = 500/18 = 27.78 \text{ moles}$ $n_{\text{CO}_2} = 27.78 \times 1.51 \times 10^{-3} \text{ moles}$ $= 42.0 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.042 \text{ moles}$	1 1/2 1/2 1/2
23	$E^\circ_{\text{Cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$ $= -0.40 - (-0.74)$ $= +0.34 \text{ V}$ $\Delta G^\circ = -nF E^\circ_{\text{cell}}$ $= -(6 \times 96500 \times 0.34) \text{ J}$ $= -196860 \text{ J/mol}$ $\Delta G^\circ = -2.303 RT \log K_c$ $\log K_c = (196860) / (2.303 \times 8.314 \times 298)$ $= 34.576$ <p style="text-align: right;">(or any other suitable method)</p>	1/2 1/2 1 1/2 1/2
24	$\log K = -E_a / 2.303 RT$ $\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left[ \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right]$ $\log \frac{4}{1} = \frac{E_a}{2.303 \times 8.314} \left[ \frac{313 - 293}{313 \times 293} \right]$ $\log 4 = \frac{E_a}{19.147} \left[ \frac{20}{313 \times 293} \right]$ $E_a = \frac{0.602 \times 19.147 \times 313 \times 293}{20}$ $= 52850 \text{ J mol}^{-1} / 52.85 \text{ kJ mol}^{-1}$	1 1 1
25	<p>(A) (a)</p>  <p>(b)</p>  <p>(c)</p> 	1 1 1
26.	<p>(a) Its high <math>\Delta_a H^\circ</math> and low <math>\Delta_{\text{hyd}} H^\circ</math>.</p> <p>(b) Cr Cr<sup>3+</sup> (d<sup>4</sup> to d<sup>3</sup>) / stable half-filled t<sub>2g</sub> level (c) Fully-filled d-orbitals hence no d-d transition / due to the absence of unpaired electron.</p>	1 1/2 1/2 1
27	<p>(a) (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>NH &lt; CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>NH<sub>2</sub> &lt; CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH</p> <p>(b) (i) aromatic halides do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by phthalimide.</p>	1 1

	(ii)  / Due to resonance the lone pair on nitrogen is less available for donation/ Due to +R effect lone pair of electrons is not easily available on N of -NH <sub>2</sub> group/ Due to -R effect of carbonyl group, electron density on N atom of -NH <sub>2</sub> group decreases.	1
28	a) Protein found in a biological system with a unique three dimensional structure and biological activity. b) Nitrogenous base + Pentose Sugar + Phosphate / a unit formed when a nucleoside is linked with phosphate. c) Those acids which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet.	1 1 1
<b>SECTION D</b>		
29	(a) (i) Slowest step. (ii) Series of elementary reaction/ Reactions involving two or more steps. (b) Increases with increase in temperature <b>OR</b> (b) Molecularity is defined only for elementary reactions whereas order is experimentally determined hence applicable for both / Because molecularity of each elementary reaction in complex reaction may be different and hence meaningless for overall complex reaction whereas order of a complex reaction is experimentally determined by the slowest step in its mechanism and is therefore applicable for both. (c) 9 times	1 1 1 1 1
30	(a) (i)  / 2-Bromophenol and 4-Bromophenol is formed. (ii)  / 2,4,6-Trinitrophenol / Picric acid is formed. b) Due to resonance, the lone pair of electrons on oxygen is not easily available for protonation. c) Phenol Due to electron releasing effect (+I effect) of methyl group/ phenoxide ion formed is less stable in cresol. <b>OR</b> (c) 2-Hydroxybenzaldehyde / 2- Hydroxybenzenecarbaldehyde.	1 1 1 1 1
<b>SECTION E</b>		
31	(A) (a) (i)  (ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{NaOH} + \text{CaO} + \text{heat} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH}_3$ (b) A = (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH=CHCH <sub>3</sub> / 2-Methylbut-2-ene B = CH <sub>3</sub> CHO / Ethanal	1 1 1 1

	C = CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> / Acetone/ Propanone	1
	OR	
31	<p>A= C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> / Butyl butanoate</p> <p>B= C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COOH / Butanoic acid</p> <p>C= C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH / Butan-1-ol</p> <p>C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub>+ dil.H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>COOH + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH</p> <p>C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH + Conc. Sulphuric acid + Heat→CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH=CH<sub>2</sub></p> <p><math display="block">C_4H_9OH \xrightarrow{CrO_3 / CH_3COOH} C_3H_7COOH</math></p>	<p>1</p> <p>½</p> <p>½</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
32	<p>A) a)</p> <p>Formation of [Fe(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>]<sup>2+</sup> </p> <p>sp<sup>3</sup>d<sup>2</sup>, octahedral, paramagnetic</p> <p>b)</p> <p>[NiCl<sub>4</sub>]<sup>2-</sup> </p> <p>sp<sup>3</sup>, tetrahedral, paramagnetic</p>	<p>1</p> <p>½ × 3</p> <p>1</p> <p>½ × 3</p>
	OR	
32	<p>B) a) (i) Aquacyanidobis(ethane-1,2-diamine) cobalt(III) ion</p> <p>(ii) Tetrachloridoplatinate(II) ion</p> <p>(iii) Tetraamminechloridonitrito-O-chromium(III)ion</p> <p>b)</p> <p>The arrangement of ligands in increasing order of field strength is called spectrochemical series /it is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands.</p> <p>Δ<sub>o</sub> &lt; P, weak field ligand ; Δ<sub>o</sub> &gt; P, strong field ligand / Weak ligand form high spin complexes whereas strong field form low spin complexes. (or any other)</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
33	<p>(A) (a) The cell reaction is</p> <p>Sn(s)+2H<sup>+</sup>(aq)→Sn<sup>2+</sup>(aq)+H<sub>2</sub>(g)</p> <p><math display="block">E_{Cell} = (E^o_c - E^o_a) - \frac{0.059}{2} \log \frac{[Sn^{2+}]}{[H^+]^2}</math></p> <p><math display="block">= [(0) - (-0.14)] - \frac{0.059}{2} \log \frac{0.004}{(0.02)^2}</math></p> <p>= 0.14 - 0.0295 log 10</p> <p>= 0.1105 V</p> <p>b) (i) overpotential of O<sub>2</sub></p> <p>(ii) Number of ions carrying current per unit volume decreases on dilution</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

OR		
<b>33</b>	B) a) At anode:	
	$\text{Pb} + \text{SO}_4^{-2} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{e}^-$	1/2
	At cathode:	
	$\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{-2} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	1/2
	Overall reaction:	
	$\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{SO}_4^{-2} + 4\text{H}^+ \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$	1
	b)	
	$E_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cell}} - \frac{0.059}{n} \log \left[ \frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}][\text{H}^+]^{14}} \right]$	1
	$E_{\text{cell}} = 1.33 - \frac{0.059}{6} \log (10^{-2})^2 / (10^{-2})(1 \times 10^{-4})^{14}$	1
	$= 1.33 - \frac{0.059}{6} (54) \log 10$	
$= 1.33 - 0.059 \times 9$		
$= 1.33 - 0.531$		
$= 0.799 \text{ V}$	1	